

GORGÉE BARYTÉE



Court-
métrage

 **SORAD**
Société des radiologistes
de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

Clinique Maisonneuve
5345, boul. de L'Assomption, bureau:130
Montréal QC H1T 4B3 • T (514) 254-0286

Clinique Bélanger
3000, Bélanger Est, bureau:201
Montréal QC H1Y 1A9 • T (514) 725-1477

GORGÉE BARYTÉE

Cet examen étudie le système digestif supérieur et permet de voir l'œsophage ainsi que la fonction de déglutition.

Il consiste à opacifier la région avec un produit de contraste, le baryum, administré par voie orale. Celui-ci progresse en tapissant les parois qui seront visibles sur les clichés obtenus par rayons X.

L'examen, d'une durée approximative de 5 minutes, permet de détecter des anomalies telles que les sténoses de l'oesophage, les tumeurs ou le mal fonctionnement de la déglutition.

Préparation :

Vous devez être à jeun depuis 21h00 la veille de l'examen sans boire, mâcher de gomme ni fumer.

Contre-indication :

Si vous êtes enceinte, cet examen est contre-indiqué. Si vous avez des allergies connues, vous devez aviser notre personnel.

Déroulement de l'examen :

- Notre équipe vous accompagnera et vous installera debout face à l'appareil à rayons X.
- Le technologue vous donnera le liquide à boire (baryum).
- Les clichés seront réalisés par notre spécialiste dans différentes positions afin de suivre la progression du baryum dans l'œsophage en temps réel.

Les effets ressentis :

La gorgée barytée n'est pas douloureuse.

Suite à l'examen :

Il faut boire beaucoup d'eau durant les prochaines 24 heures pour faciliter l'élimination du baryum. Les selles peuvent être de couleur blanchâtre pour 48 à 72 heures après l'examen.

Le résultat de votre examen sera envoyé à votre médecin traitant qui s'occupera de faire le suivi si nécessaire.